

Hiérarchisation des mammifères présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

nom scientifique	nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge UICN France	PNA	Statut protection France		Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
						extinction	Article 2	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Capra pyrenaica	Bouquetin des Pyrénées		éteint	RE		*	*	*	*	3	3,3	3,6	REEX
Galemys pyrenaicus	Desman des Pyrénées	forte	Déterminante stricte	NT	*	*	*	*	*	4	3,5	3,0	TRFO
Ursus arctos	Ours brun, Ours	forte	Déterminante à critères	CR	*	*	*	*	*	3,5	3,0	2,0	TRFO
Lynx lynx	Lynx boréal	faible	Déterminante à critères	EN	*	*	*	*	*	3,5	3,0	2,0	FORT
Arvicola sapidus	Campagnol amphibie	modérée	remarquable	NT			*			1,5	1,3	2,8	FORT
Felis silvestris	Chat sauvage	modérée	Déterminante à critères	LC			*		*	2,5	1,3	2,8	FORT
Canis lupus	Loup	modérée	Déterminante à critères	VU	*	*	*	*	*	4	3,0	1,0	FORT
Neomys anomalus	Crossope de Miller, Musaraigne de Miller	faible	Déterminante stricte	LC			*			1,5	1,3	2,6	MODE
Lutra lutra	Loutre d'Europe, Loutre	modérée	Déterminante stricte	LC	*	*	*	*	*	3,5	2,5	1,2	FORT
Castor fiber	Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe	modérée	Déterminante stricte	LC			*	*	*	3	1,5	1,8	MODE
Muscardinus avellanarius	Muscardin	faible	remarquable	LC			*		*	2,5	0,5	2,6	MODE
Rupicapra pyrenaica	Isard	modérée	Déterminante stricte	LC						0	1,5	1,4	MODE
Crociodura suaveolens	Crociodure des jardins	faible		NT						0	0,8	1,8	MODE
Chionomys nivalis	Campagnol des neiges	modérée	remarquable	LC						0	0,8	1,8	MODE
Oryctolagus cuniculus	Lapin de garenne	faible		NT						0	0,8	1,6	MODE
Micromys minutus	Rat des moissons	faible	remarquable	LC						0	0,5	1,8	MODE
Neomys fodiens	Crossope aquatique, Musaraigne aquatique	modérée	remarquable	LC			*			1,5	0,8	1,4	MODE
Genetta genetta	Genette commune, Genette	modérée		LC			*			1,5	0,5	1,0	FAIB
Erinaceus europaeus	Hérisson d'Europe	faible		LC			*			1,5	0,3	0,8	FAIB
Sciurus vulgaris	Écureuil roux	faible		LC			*			1,5	0,3	0,6	FAIB
Rupicapra rupicapra	Chamois		introduit	LC									INTR
Marmota marmota	Marmotte des Alpes, Marmotte		introduit	LC									INTR
Ovis ammon	Mouflon, Mouflon méditerranéen, Mouflon de Corse		introduit	VU									INTR
Myocastor coypus	Ragondin		introduit	NAa									INTR
Ondatra zibethicus	Rat musqué		introduit	NAa									INTR
Rattus norvegicus	Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout		introduit	NAa									INTR
Mustela nivalis	Belette d'Europe, Belette			LC									NH
Meles meles	Blaireau européen			LC									NH
Microtus agrestis	Campagnol agreste			LC									NH
Microtus arvalis	Campagnol des champs			LC									NH
Microtus gerbei	Campagnol des Pyrénées			LC									NH
Microtus duodecimcostatus	Campagnol provençal			LC									NH
Clethrionomys glareolus	Campagnol roussâtre			LC									NH
Microtus subterraneus	Campagnol souterrain			LC									NH
Arvicola terrestris	Campagnol terrestre			DD									NH
Cervus elaphus	Cerf élaphe			LC									NH
Capreolus capreolus	Chevreuril européen, Chevreuil			LC									NH
Crociodura russula	Crociodure musette			LC									NH
Martes foina	Fouine			LC									NH
Mustela erminea	Hermine			LC									NH
Eliomys quercinus	Lérot			LC									NH
Lepus europaeus	Lièvre d'Europe			LC									NH

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des mammifères présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

nom scientifique	nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge UICN France	PNA	Statut protection France		Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
						extinction	Article 2	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Glis glis	Loir gris, Loir			LC									NH
Martes martes	Martre des pins, Martre			LC									NH
Apodemus flavicollis	Mulot à collier			LC									NH
Apodemus sylvaticus	Mulot sylvestre			LC									NH
Sorex araneus	Musaraigne carrelet			DD									NH
Sorex coronatus	Musaraigne couronnée			LC									NH
Sorex minutus	Musaraigne pygmée			LC									NH
Suncus etruscus	Pachyure étrusque			LC									NH
Mustela putorius	Putois d'Europe, Furet			LC									NH
Rattus rattus	Rat noir, Rat commun			LC									NH
Vulpes vulpes	Renard roux			LC									NH
Sus scrofa	Sanglier			LC									NH
Mus spretus	Souris d'Afrique du Nord			LC									NH
Mus musculus	Souris grise, Souris domestique			LC									NH
Talpa europaea	Taupe d'Europe			LC									NH

Hiérarchisation des mammifères présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

nom scientifique	nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge UICN France	PNA	Statut protection France		Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
						extinction	Article 2	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Rhinolophus mehelyi	Rhinolophe de Mehely	très forte	Déterminante stricte	CR	*	*	*	*	*	3,5	3,8	3,6	REDH
Myotis escaleraei	Murin d'Escalera	très forte	remarquable	DD	*		*		*	2,5	2,7	3,3	TRFO
Miniopterus schreibersii	Minioptère de Schreibers	forte	Déterminante stricte	VU	*		*	*	*	3	3,3	2,6	TRFO
Myotis capaccinii	Murin de Capaccini, Vespertilion de Capaccini	forte	Déterminante stricte	VU	*		*	*	*	3	3,3	2,6	TRFO
Rhinolophus euryale	Rhinolophe euryale	forte	Déterminante stricte	NT	*		*	*	*	3	3,0	2,4	TRFO
Myotis bechsteinii	Murin de Bechstein	modérée	Déterminante stricte	NT	*		*	*	*	3	2,8	2,6	FORT
Nyctalus lasiopterus	Grande Noctule	modérée	Déterminante à critères	DD	*		*		*	2,5	2,7	2,0	FORT
Myotis blythii	Petit Murin	forte	Déterminante à critères	NT	*		*	*	*	3	2,8	1,6	FORT
Myotis alcathoe	Murin d'Alcathoe	faible	Déterminante à critères	LC	*		*		*	2,5	1,8	2,6	FORT
Rhinolophus ferrumequinum	Grand rhinolophe	modérée	Déterminante à critères	NT	*		*	*	*	3	2,5	1,4	FORT
Nyctalus leisleri	Noctule de Leisler	modérée	Déterminante à critères	NT	*		*		*	2,5	2,5	1,4	MODE
Tadarida teniotis	Molosse de Cestoni	forte	Déterminante à critères	LC	*		*		*	2,5	2,3	1,6	FORT
Barbastella barbastellus	Barbastelle d'Europe, Barbastelle	modérée	Déterminante stricte	LC	*		*	*	*	3	2,3	1,4	MODE
Myotis myotis	Grand Murin	faible	Déterminante à critères	LC	*		*	*	*	3	1,8	1,8	MODE
Pipistrellus nathusii	Pipistrelle de Nathusius	modérée	remarquable	NT	*		*		*	2,5	2,0	1,4	MODE
Rhinolophus hipposideros	Petit rhinolophe	modérée	Déterminante à critères	LC	*		*	*	*	3	2,0	1,4	MODE
Myotis nattereri	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	faible	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,3	2,0	MODE
Nyctalus noctula	Noctule commune	faible	Déterminante à critères	NT	*		*		*	2,5	2,3	1,0	MODE
Myotis brandtii	Murin de Brandt	faible		LC	*		*		*	2,5	1,0	2,0	MODE
Myotis emarginatus	Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées	modérée	Déterminante à critères	LC	*		*	*	*	3	2,0	1,0	MODE
Plecotus auritus	Oreillard roux, Oreillard septentrional	faible	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,3	1,6	MODE
Hypsugo savii	Vespère de Savi	forte	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,8	1,0	MODE
Vespertilio murinus	Serotine bicolore	faible		DD	*		*		*	2,5	1,3	1,4	MODE
Plecotus austriacus	Oreillard gris, Oreillard méridional	modérée	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,5	1,2	MODE
Myotis mystacinus	Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches	faible	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,3	1,2	MODE
Plecotus macrotis	Oreillard montagnard	faible		DD	*		*		*	2,5	1,3	1,0	MODE
Pipistrellus pygmaeus	Pipistrelle soprane	modérée		LC	*		*		*	2,5	1,3	1,0	MODE
Eptesicus nilssonii	Sérotine de Nilsson	faible		LC	*		*		*	2,5	1,0	1,2	MODE
Eptesicus serotinus	Sérotine commune	faible	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,3	0,6	FAIB
Pipistrellus kuhlii	Pipistrelle de Kuhl	modérée	remarquable	LC	*		*		*	2,5	1,5	0,2	FAIB
Myotis daubentonii	Vespertilion nathaline, Vespertilion de Daubenton	faible		LC	*		*		*	2,5	1,0	0,6	FAIB
Pipistrellus pipistrellus	Pipistrelle commune	faible		LC	*		*		*	2,5	1,0	0,2	FAIB

Hiérarchisation des amphibiens présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge UICN France	Liste rouge Régionale	PNA	Statut protection France			Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
							Extinction	Article 2	Article 3	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Pelobates cultripes	Pélobate cultripède	forte	déterminante stricte	VU	VU			*			*	2,5	2,6	3,2	TRFO
Pelophylax kl. grafi	Grenouille de Graf	très forte	déterminante stricte	DD	EN				*			1,0	3,0	2,6	TRFO
Calotriton asper	Calotriton des Pyrénées	modérée	déterminante stricte	NT	VU			*			*	2,5	2,2	3,2	FORT
Triturus cristatus	Triton crêté	faible	déterminante stricte	LC	EN			*		*	*	3,0	1,8	2,8	FORT
Pelophylax perezi	Grenouille de Perez	modérée	déterminante stricte	NT	VU				*			1,0	2,2	2,0	FORT
Rana dalmatina	Grenouille agile	faible	déterminante stricte	LC	VU			*			*	2,5	1,6	2,4	FORT
Rana lessonae	Grenouille de Lessona	faible		NT	VU			*			*	3,0	1,2	2,4	MODE
Triturus marmoratus	Triton marbré	faible	remarquable	LC	NT			*			*	2,5	0,8	2,2	MODE
Pelophylax kl. esculentus	Grenouille verte hybride	faible		LC	VU							0,0	0,8	2,0	MODE
Hyla meridionalis	Rainette méridionale	modérée		LC	LC			*			*	2,5	0,4	1,2	FAIB
Salamandra salamandra	Salamandre tachetée	faible		LC	LC				*			1,0	0,2	1,4	FAIB
Alytes obstetricans	Alyte accoucheur	faible		LC	LC			*			*	2,5	0,2	1,2	FAIB
Pelodytes punctatus	Pélodyte ponctué	faible		LC	LC				*			1,0	0,2	1,2	FAIB
Bufo calamita	Crapaud calamite	faible		LC	LC			*			*	2,5	0,2	1,0	FAIB
Lissotriton helveticus	Triton palmé	faible		LC	LC				*			1,0	0,2	1,0	FAIB
Bufo bufo	Crapaud commun	faible		LC	LC				*			1,0	0,2	0,8	FAIB
Rana temporaria	Grenouille rousse			LC	LC										NH
Bombina variegata	Sonneur à ventre jaune		Introduit	VU	NE	*		*		*	*	3,0			INTR
Discoglossus pictus	Discoglosse peint		Introduit	NE	NE			*			*	2,5			INTR
Pelophylax ridibundus	Grenouille rieuse		Introduit	LC	NE				*			1,5			INTR
Ichthyosaura alpestris	Triton alpestre		Introduit	LC	NE				*						INTR

Hiérarchisation des reptiles présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	Statut protection France			Statut Directive habitats		notes d'enjeu			enjeu régional LR
							Extinction	Article 2	Article 3	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Testudo hermanni	Tortue d'Hermann		éteinte	VU	EX	*		*		*	*				REEX
Mauremys leprosa	Emyde lépreuse	très forte	déterminante stricte	EN	EN	*	*	*		*	*	3,5	4,0	2,2	TRFO
Timon lepidus	Lézard ocellé	forte	déterminante stricte	VU	VU	*			*			1,0	3,4	2,4	TRFO
Psammodromus hispanicus	Psammodrome d'Edwards	forte	déterminante stricte	NT	VU				*			1,0	2,4	2,8	FORT
Hemidactylus turcicus	Hémidactyle verruqueux	modérée	déterminante stricte	NT	EN				*			1,0	2,4	2,6	FORT
Emys orbicularis	Cistude d'Europe	faible	déterminante stricte	NT	VU	*		*		*	*	3,0	2,8	2,0	FORT
Lacerta agilis	Lézard des souches	faible	déterminante stricte	LC	VU			*			*	2,5	1,6	2,6	FORT
Zootoca vivipara	Lézard vivipare	faible	déterminante stricte	LC	VU				*		*	2,0	1,6	2,6	FORT
Vipera berus	Vipère péliade	faible	déterminante stricte	LC	VU							0,0	1,6	2,2	MODE
Chalcides striatus	Seps strié	forte		LC	VU				*			1,0	1,2	2,2	MODE
Psammodromus algirus	Psammodrome algire	très forte	remarquable	LC	NT				*			1,0	1,4	1,4	MODE
Malpolon monspessulanus	Couleuvre de Montpellier	très forte		LC	NT				*			1,0	1,2	1,6	MODE
Rhinechis scalaris	Couleuvre à échelons	forte		LC	NT				*			1,0	1,0	1,6	MODE
Coronella austriaca	Coronelle lisse	faible		LC	NT			*			*	2,5	0,6	1,8	MODE
Zamenis longissimus	Couleuvre d'Esculape	faible	remarquable	LC	LC			*			*	2,5	0,4	1,6	MODE
Podarcis liolepis	Lézard catalan	très forte		LC	LC			*				1,5	0,8	1,2	FAIB
Hierophis viridiflavus	Couleuvre verte et jaune	faible		LC	LC			*			*	2,5	0,2	1,6	FAIB
Natrix maura	Couleuvre vipérine	faible		LC	LC				*			1,0	0,2	1,6	FAIB
Coronella girondica	Coronelle girondine	modérée		LC	LC				*			1,0	0,4	1,4	FAIB
Tarentola mauritanica	Tarente de Maurétanie	forte		LC	LC				*			1,0	0,6	1,0	FAIB
Lacerta bilineata	Lézard vert occidental	faible		LC	LC			*			*	2,5	0,2	1,4	FAIB
Natrix natrix	Couleuvre à collier	faible		LC	LC			*			*	2,5	0,2	1,4	FAIB
Anguis fragilis	Orvet fragile	faible		LC	LC				*			1,0	0,2	1,0	FAIB
Podarcis muralis	Lézard des murailles	faible		LC	LC			*			*	2,5	0,2	0,6	FAIB
Vipera aspis	Vipère aspic			LC	LC										NH

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance znieff	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	Statut protection France			Statut Directive oiseaux	notes d'enjeu			enjeu régional LR
							extinction	Art 3	Art 4		juridique	responsabilité	sensibilité	
Bonasa bonasia	Gélinotte des bois			VU						*				REEX
Charadrius morinellus	Pluvier guignard			NA				*		*				REEX
Crex crex	Râle des genêts			EN			*	*		*				REEX
Oenanthe leucura	Traquet rieur			RE				*		*				REEX
Aquila fasciata	Aigle de Bonelli	forte	déterminante stricte	EN	E 2	*	*	*		*	3,5	3,8	3,4	REDH
Neophron percnopterus	Vautour percnoptère	modérée	déterminante stricte	EN	E 2	*		*		*	3,0	3,6	3,4	REDH
Lanius minor	Pie-grièche à poitrine rose	très forte	déterminante stricte	CR	E 2	*	*	*		*	3,5	3,8	3,0	REDH
Gypaetus barbatus	Gypaète barbu	modérée	déterminante stricte	EN	V 8	*	*	*		*	3,5	3,4	3,0	REDH
Remiz pendulinus	Rémiz penduline, Mésange rémiz	forte	déterminante stricte	EN	E 1			*			1,5	3,0	3,4	TRFO
Botaurus stellaris	Butor étoilé	très forte	déterminante stricte	VU	R 9	*		*		*	3,0	3,4	2,6	TRFO
Sylvia conspicillata	Fauvette à lunettes	forte	déterminante à critères	EN	R 9			*			1,5	2,4	3,6	TRFO
Tetrao urogallus	Grand Tétras	modérée	déterminante à critères	VU	V 5	*				*	1,5	3,0	3,0	TRFO
Oenanthe hispanica	Traquet oreillard	forte	déterminante stricte	EN	V 4			*			1,5	2,8	3,0	TRFO
Melanocorypha calandra	Alouette calandre	modérée	remarquable	EN	E 1	*	*	*		*	3,5	2,8	2,8	TRFO
Lanius excubitor	Pie-grièche grise	faible	déterminante stricte	EN	R 9	*		*			1,5	2,8	2,8	TRFO
Lanius meridionalis	Pie-grièche méridionale	forte	déterminante à critères	VU	LR 16	*		*			1,5	2,8	2,8	TRFO
Aegypius monachus	Vautour moine	très forte	déterminante stricte	CR	V 8	*	*	*		*	3,5	3,8	1,8	TRFO
Perdix perdix hispaniensis	Perdrix grise des Pyrénées	très forte	déterminante à critères	VU	V 4					*	1,5	2,6	2,8	FORT
Lanius senator	Pie-grièche à tête rousse	forte	déterminante à critères	NT	LR 16	*		*		*	1,5	2,6	2,6	FORT
Galerida theklae	Cochevis de Thékla	très forte	déterminante à critères	VU	R 9			*		*	3,0	2,4	2,8	TRFO
Glareola pratincola	Glaréole à collier	forte	déterminante stricte	EN	V 6		*	*		*	3,5	2,8	2,4	FORT
Calandrella brachydactyla	Alouette calandrelle	forte	déterminante stricte	NT	S 13			*		*	3,0	2,0	3,0	FORT
Numenius arquata	Courlis cendré	faible	déterminante stricte	VU	V 6						0,0	2,2	2,8	FORT
Falco naumanni	Faucon crécerellette	forte	déterminante stricte	VU	V 6	*	*	*		*	3,5	3,4	1,6	FORT
Chroicocephalus genei	Goéland railleur	très forte	déterminante stricte	EN	L 10			*		*	3,0	2,8	2,2	FORT
Milvus milvus	Milan royal	modérée	remarquable	VU	V 6	*		*		*	3,0	2,6	2,4	FORT
Acrocephalus melanopogon	Lusciniolle à moustaches	forte	déterminante stricte	NT	LR 16			*		*	3,0	2,2	2,6	FORT
Porphyrio porphyrio	Talève sultane	très forte	déterminante stricte	EN	V 6			*		*	3,0	3,0	1,8	FORT
Cecropis daurica	Hirondelle rousseline	forte	déterminante stricte	VU	V 6			*			1,5	2,6	2,0	FORT
Tetrax tetrax	Outarde canepetière	forte	déterminante à critères	VU	L 10	*	*	*		*	3,5	3,0	1,6	FORT
Emberiza schoeniclus whiterbyi	Bruant des roseaux Whiterby	forte		DD	L 9			*			1,5	1,3	3,3	FORT
Ixobrychus minutus	Blongios nain	modérée	déterminante stricte	NT	E 2		*	*		*	3,5	2,4	2,0	FORT
Emberiza hortulana	Bruant ortolan	forte	déterminante à critères	VU	LR 16			*		*	3,0	2,2	2,2	FORT
Ardeola ralloides	Crabier chevelu	très forte	déterminante stricte	NT	V 6			*		*	3,0	2,6	1,8	FORT
Ardea purpurea	Héron pourpré	forte	déterminante à critères	LC	D 11			*		*	3,0	1,4	3,0	FORT
Lagopus mutus pyrenaicus	Lagopède des Pyrénées	modérée	déterminante stricte	NT	V 5					*	1,5	2,2	2,2	FORT
Acrocephalus arundinaceus	Rousserolle turdoïde	modérée	remarquable	VU	L 10			*			1,5	1,6	2,8	FORT
Gelochelidon nilotica	Sterne hansel	très forte	déterminante stricte	VU	L 10			*		*	3,0	2,6	1,8	FORT

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance znieff	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	Statut protection France			Statut Directive oiseaux	notes d'enjeu			enjeu régional LR
							extinction	Art 3	Art 4		juridique	responsabilité	sensibilité	
<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	faible	déterminante stricte	LC	E 3			*			1,5	1,8	2,4	MODE
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	modérée	déterminante stricte	VU	V 6			*		*	3,0	2,4	1,6	FORT
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	forte	déterminante à critères	NT	D 11			*		*	3,0	1,8	2,2	FORT
<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle luscinioides	modérée		EN	S 13			*			1,5	1,4	2,6	FORT
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	modérée	déterminante à critères	VU	L 10			*		*	3,0	2,0	2,0	FORT
<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	très forte	déterminante à critères	LC	D 11			*		*	3,0	1,6	2,2	FORT
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	modérée	déterminante stricte	LC	V 6						0,0	1,8	2,0	MODE
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Oedicnème criard	modérée	déterminante à critères	NT	V 5			*		*	3,0	2,0	1,8	FORT
<i>Aquila pennata</i>	Aigle botté	modérée	déterminante stricte	VU	I 15		*	*		*	3,5	2,0	1,6	FORT
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	modérée	déterminante stricte	LC	V 5			*		*	3,0	1,8	1,8	MODE
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guigette	faible	déterminante stricte	LC	V 6			*			1,5	1,6	2,0	MODE
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	forte	déterminante à critères	LC	D 11			*		*	3,0	1,4	2,2	FORT
<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	Crave à bec rouge	forte	déterminante stricte	LC	S 13			*		*	3,0	1,6	2,0	MODE
<i>Casmerodius albus</i>	Grande Aigrette	modérée	déterminante stricte	NT	V 8			*		*	3,0	2,2	1,4	MODE
<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	faible		VU	S 13			*		*	3,0	1,0	2,6	MODE
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	faible		EN	S 13						0,0	1,2	2,4	MODE
<i>Perdix perdix armoricana</i>	Perdrix grise de montagne	modérée		LC	E 2					*	1,5	1,2	2,4	MODE
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	faible		VU				*			1,5	0,8	2,8	MODE
<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	forte	remarquable	NT	LR 16			*			1,5	1,6	1,8	MODE
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	très forte	déterminante stricte	NA	S 13			*		*	3,0	1,8	1,6	MODE
<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	forte	remarquable	LC	LR 16			*		*	3,0	1,2	2,2	MODE
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	modérée	déterminante stricte	LC	R 9			*		*	3,0	1,6	1,8	MODE
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	modérée	remarquable	VU	D 11			*		*	3,0	1,4	2,0	MODE
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	modérée		VU	R 9			*		*	3,0	1,4	2,0	MODE
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	faible	remarquable	LC	D 11	*		*			1,5	1,4	2,0	MODE
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	forte	déterminante à critères	NT	LR 16			*		*	3,0	2,0	1,4	MODE
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	modérée	déterminante stricte	LC	E 1						0,0	2,0	1,4	MODE
<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches	modérée		LC	L 10			*			1,5	0,8	2,5	MODE
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	forte	déterminante à critères	LC	L 10			*		*	3,0	1,6	1,6	MODE
<i>Elanus caeruleus</i>	Élanion blanc	faible		EN	V 8			*		*	3,0	1,6	1,6	MODE
<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	très forte	déterminante à critères	LC	L 10			*		*	3,0	1,8	1,4	MODE
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	faible		DD	S 13			*		*	3,0	0,5	2,6	MODE
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	forte	déterminante à critères	LC	L 10			*		*	3,0	1,6	1,4	MODE
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	modérée	déterminante à critères	LC	R 9						0,0	1,4	1,6	MODE
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	faible	déterminante stricte	LC	V 8			*		*	3,0	1,6	1,4	MODE
<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu	forte		LC				*			1,5	0,6	2,4	MODE
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	modérée	déterminante stricte	LC	R 9						0,0	1,6	1,4	MODE
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	faible		VU	S 13			*			1,5	1,0	2,0	MODE

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

							Statut protection France			Statut Directive oiseaux	notes d'enjeu			
Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance znieff	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	extinction	Art 3	Art 4	Annexe I	juridique	responsabilité	sensibilité	enjeu régional LR
Phylloscopus sibilatrix	Pouillot siffleur	faible		VU	V 6			*			1,5	1,4	1,6	MODE
Anas querquedula	Sarcelle d'été	faible		VU	S 13						0,0	1,0	2,0	MODE
Sterna hirundo	Sterne pierregarin	modérée	déterminante à critères	LC	L 10			*		*	3,0	1,4	1,6	MODE
Turdus torquatus	Merle à plastron	faible		LC				*			1,5	0,2	2,8	MODE
Himantopus himantopus	Échasse blanche	forte	déterminante à critères	LC	L 10			*		*	3,0	1,6	1,2	MODE
Falco peregrinus	Faucon pèlerin	modérée	déterminante stricte	LC	R 9			*		*	3,0	1,6	1,2	MODE
Bubo bubo	Grand-duc d'Europe	forte	déterminante à critères	LC	LR 16			*		*	3,0	1,6	1,2	MODE
Merops apiaster	Guêpier d'Europe	forte	remarquable	LC	D 11			*			1,5	1,0	1,8	MODE
Chlidonias hybridus	Guifette moustac	faible		NT	S 13			*		*	3,0	0,8	2,0	MODE
Bubulcus ibis	Héron garde-boeufs	modérée	déterminante à critères	LC	L 10			*			1,5	1,4	1,4	MODE
Jynx torquilla	Torcol fourmilier	faible		NT	S 13			*			1,5	0,8	2,0	MODE
Prunella collaris	Accenteur alpin	faible		LC	R 9			*			1,5	0,6	2,0	MODE
Aegolius funereus	Chouette de Tengmalm	faible	remarquable	LC	V 6			*		*	3,0	1,0	1,6	MODE
Galerida cristata	Cochevis huppé	modérée		LC	S 13			*			1,5	0,6	2,0	MODE
Sylvia undata	Fauvette pitchou	forte		LC				*		*	3,0	0,6	2,0	MODE
Asio flammeus	Hibou des marais	faible		VU				*		*	3,0	0,8	1,8	MODE
Apus pallidus	Martinet pâle	modérée		LC	L 10			*			1,5	0,8	1,8	MODE
Phylloscopus trochilus	Pouillot fitis	faible		NT	L 10			*			1,5	1,0	1,6	MODE
Tetrao tetrix	Tétras lyre	faible		LC						*	1,5	0,2	2,4	MODE
Pyrrhula pyrrhula	Bouvreuil pivoine	faible		VU				*			1,5	0,8	1,6	MODE
Muscicapa striata	Gobemouche gris	faible		VU				*			1,5	0,8	1,6	MODE
Upupa epops	Huppe fasciée	modérée	remarquable	LC	D 11			*			1,5	0,8	1,6	MODE
Carduelis cannabina	Linotte mélodieuse	faible		VU				*			1,5	0,8	1,6	MODE
Apus melba	Martinet à ventre blanc, Martinet alpin	modérée		LC	R 9			*			1,5	0,8	1,6	MODE
Otus scops	Petit-duc scops	forte		LC	D 11			*			1,5	0,8	1,6	MODE
Carduelis spinus	Tarin des aulnes	faible		NT	S 13			*			1,5	0,8	1,6	MODE
Circus cyaneus	Busard Saint-Martin	faible		LC	R 9			*		*	3,0	0,6	1,8	MODE
Pyrrhocorax graculus	Chocard à bec jaune	faible		LC	R 9			*			1,5	0,6	1,8	MODE
Oenanthe oenanthe	Traquet motteux	faible		NT				*			1,5	0,6	1,8	MODE
Nucifraga caryocatactes	Cassenoix moucheté	faible		LC				*			1,5	0,2	2,0	MODE
Aythya ferina	Fuligule milouin	faible		LC	V 7						0,0	0,8	1,4	MODE
Ficedula hypoleuca	Gobemouche noir	faible		LC	L 10			*			1,5	0,6	1,6	MODE
Podiceps cristatus	Grèbe huppé	faible		LC	R 9			*			1,5	0,6	1,6	MODE
Monticola saxatilis	Monticole de roche	forte		LC				*			1,5	0,6	1,6	MODE
Charadrius dubius	Petit Gravelot	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,8	MODE
Dendrocopos medius	Pic mar	faible		LC	E 3			*		*	3,0	1,0	1,2	MODE
Serinus citrinella	Venturon montagnard	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,8	MODE
Sturnus unicolor	Étourneau unicolore	forte		LC	LR 16			*			1,5	1,0	1,0	MODE

Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance znieff	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	Statut protection France			Statut Directive oiseaux	notes d'enjeu			enjeu régional LR
							extinction	Art 3	Art 4		juridique	responsabilité	sensibilité	
<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée	forte		LC				*			1,5	0,6	1,4	MODE
<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	forte		LC				*			1,5	0,6	1,4	MODE
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	faible		LC				*			1,5	0,2	1,8	MODE
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	faible		LC	L 10			*			1,5	0,6	1,4	MODE
<i>Parus ater</i>	Mésange noire	faible		NT				*			1,5	0,6	1,4	MODE
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	faible		LC				*		*	3,0	0,2	1,8	MODE
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,6	MODE
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	modérée		LC				*		*	3,0	0,4	1,6	MODE
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	faible		LC				*			1,5	0,2	1,8	MODE
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	faible		LC				*			1,5	0,2	1,6	FAIB
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	faible		LC				*		*	3,0	0,2	1,6	FAIB
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers	faible		LC				*			1,5	0,2	1,6	MODE
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	modérée	remarquable	LC	R 9						0,0	1,0	0,8	FAIB
<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	faible		LC				*			1,5	0,2	1,6	FAIB
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	faible		LC				*		*	3,0	0,2	1,6	FAIB
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	faible		LC				*			1,5	0,2	1,6	FAIB
<i>Regulus ignicapillus</i>	Roitelet à triple bandeau	faible		LC				*			1,5	0,2	1,6	FAIB
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	faible		NT				*			1,5	0,6	1,2	FAIB
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,4	FAIB
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	modérée		LC				*		*	3,0	0,4	1,4	FAIB
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	faible		LC	S 13			*			1,5	0,4	1,4	FAIB
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,4	FAIB
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	faible		LC	I 15			*			1,5	0,4	1,2	FAIB
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	faible		LC	S 13						0,0	0,4	1,2	FAIB
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	forte		LC				*			1,5	0,6	1,0	FAIB
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	faible		LC	D 11						0,0	0,4	1,2	FAIB
<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	forte		LC				*			1,5	0,6	1,0	FAIB
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,2	FAIB
<i>Coccothraustes Coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	faible		LC	R 9			*			1,5	0,6	1,0	FAIB
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	faible		NT				*			1,5	0,6	1,0	FAIB
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,2	FAIB
<i>Cinclus cinclus</i>	Cincle plongeur	faible		LC				*			1,5	0,2	1,4	FAIB
<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe	faible		LC				*			1,5	0,2	1,4	FAIB
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	faible		LC				*			1,5	0,2	1,4	FAIB
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	faible		LC				*			1,5	0,2	1,4	FAIB
<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	modérée		DD	S 13						0,0	0,8	0,8	FAIB
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB

Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance znieff	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	Statut protection France			Statut Directive oiseaux	notes d'enjeu			enjeu régional LR
							extinction	Art 3	Art 4		juridique	responsabilité	sensibilité	
Emberiza calandra	Bruant proyer	faible		NT				*			1,5	0,6	0,8	FAIB
Cygnus olor	Cygne tuberculé	faible		NA	V 6			*			1,5	0,8	0,6	FAIB
Falco subbuteo	Faucon hobereau	faible		LC	I 15			*			1,5	0,4	1,0	FAIB
Sylvia communis	Fauvette grisette	faible		NT				*			1,5	0,6	0,8	FAIB
Larus michahellis	Goéland leucophée	forte		LC				*			1,5	0,6	0,8	FAIB
Certhia familiaris	Grimpereau des bois	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
Oriolus oriolus	Loriot d'Europe	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe	faible		LC				*		*	3,0	0,2	1,2	FAIB
Parus palustris	Mésange nonnette	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
Petronia petronia	Moineau soulcie	forte		LC				*			1,5	0,6	0,8	FAIB
Dendrocopos minor	Pic épeichette	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
Serinus serinus	Serin cini	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
Tadorna tadorna	Tadorne de Belon	modérée		LC				*			1,5	0,4	1,0	FAIB
Carduelis chloris	Verdier d'Europe	faible		LC				*			1,5	0,2	1,2	FAIB
Lullula arborea	Alouette lulu	modérée		LC				*		*	3,0	0,4	0,8	FAIB
Anas clypeata	Canard souchet	faible		LC	S 13						0,0	0,4	0,8	FAIB
Columba oenas	Pigeon colombin	faible		LC	S 13						0,0	0,4	0,8	FAIB
Luscinia megarhynchos	Rossignol philomèle	modérée		LC				*			1,5	0,4	0,8	FAIB
Motacilla cinerea	Bergeronnette des ruisseaux	faible		LC				*			1,5	0,2	1,0	FAIB
Sylvia borin	Fauvette des jardins	faible		LC				*			1,5	0,2	1,0	FAIB
Asio otus	Hibou moyen-duc	faible		LC				*			1,5	0,2	1,0	FAIB
Delichon urbicum	Hirondelle de fenêtre	faible		LC				*			1,5	0,2	1,0	FAIB
Hirundo rustica	Hirondelle rustique	faible		LC				*			1,5	0,2	1,0	FAIB
Perdix perdix	Perdrix grise	faible		LC						*	1,5	0,2	1,0	FAIB
Phylloscopus collybita	Pouillot véloce	faible		LC				*			1,5	0,2	1,0	FAIB
Prunella modularis	Accenteur mouchet	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Motacilla alba	Bergeronnette grise	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Carduelis carduelis	Chardonneret élégant	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Corvus monedula	Choucas des tours	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Falco tinnunculus	Faucon crécerelle	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Picus viridis	Pic vert	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Phoenicurus ochruros	Rougequeue noir	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Troglodytes troglodytes	Troglodyte mignon	faible		LC				*			1,5	0,2	0,8	FAIB
Buteo buteo	Buse variable	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB
Cuculus canorus	Coucou gris	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB
Apus apus	Martinet noir	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB
Passer domesticus	Moineau domestique	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB
Fringilla coelebs	Pinson des arbres	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB

Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

							Statut protection France			Statut Directive oiseaux	notes d'enjeu			
Nom scientifique	Nom vernaculaire	responsabilité régionale	déterminance znieff	Liste rouge France	Liste Rouge régionale	PNA	extinction	Art 3	Art 4	Annexe I	juridique	responsabilité	sensibilité	enjeu régional LR
Phoenicurus phoenicurus	Rougequeue à front blanc	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB
Saxicola torquata	Tarier patre	faible		LC				*			1,5	0,2	0,6	FAIB
Emberiza cirlus	Bruant zizi	faible		LC				*			1,5	0,2	0,4	FAIB
Sylvia atricapilla	Fauvette à tête noire	faible		LC				*			1,5	0,2	0,4	FAIB
Certhia brachydactyla	Grimpereau des jardins	faible		LC				*			1,5	0,2	0,4	FAIB
Ardea cinerea	Héron cendré	faible		LC				*			1,5	0,2	0,4	FAIB
Hippolais polyglotta	Hypolaïs polyglotte	faible		LC				*			1,5	0,2	0,4	FAIB
Strix aluco	Chouette hulotte	faible		LC				*			1,5	0,2	0,2	FAIB
Aegithalos caudatus	Mésange à longue queue	faible		LC				*			1,5	0,2	0,2	FAIB
Parus caeruleus	Mésange bleue	faible		LC				*			1,5	0,2	0,2	FAIB
Parus major	Mésange charbonnière	faible		LC				*			1,5	0,2	0,2	FAIB
Dendrocopos major	Pic épeiche	faible		LC				*			1,5	0,2	0,2	FAIB
Erithacus rubecula	Rougegorge familier	faible		LC				*			1,5	0,2	0,2	FAIB
Alauda arvensis	Alouette des champs			LC										NH
Anas platyrhynchos	Canard colvert			LC										NH
Anas penelope	Canard siffleur			NA										NH
Corvus frugilegus	Corbeau freux			LC										NH
Corvus corone	Corneille noire			LC										NH
Sturnus vulgaris	Étourneau sansonnet			LC										NH
Phasianus colchicus	Faisan de Colchide			LC										NH
Fulica atra	Foulque macroule			LC										NH
Garrulus glandarius	Geai des chênes			LC										NH
Turdus viscivorus	Grive draine			LC										NH
Turdus pilaris	Grive litorne			LC										NH
Turdus philomelos	Grive musicienne			LC										NH
Threskiornis aethiopicus	Ibis sacré			LC										NH
Turdus merula	Merle noir			LC										NH
Alectoris rufa	Perdrix rouge			LC										NH
Pica pica	Pie bavarde			LC										NH
Columba livia	Pigeon biset			LC										NH
Columba palumbus	Pigeon ramier			LC										NH
Anthus trivialis	Pipit des arbres			LC										NH
Gallinula chloropus	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau			LC										NH
Streptopelia turtur	Tourterelle des bois			LC										NH
Streptopelia decaocto	Tourterelle turque			LC										NH
Psittacula krameri	Perruche à collier		introduit	NA a										INTR

Hierarchisation des poissons présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Responsabilité régionale	Déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge France	PNA	Statut protection France		Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
						extinction	Article 1	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Aphanius iberus	Aphanius d'Espagne		éteinte	RE				*					REEX
Valencia hispanica	Cyprinodonte de Valence		éteinte	RE				*	*				REEX
Acipenser sturio	Esturgeon		éteinte	CR		*		*	*				REEX
Zingel asper	Apron du Rhône	faible	déterminante stricte	CR	*	*	*	*	*	3,5	3,3	4,0	REDH / REEX
Cottus petiti	Chabot du lez	très forte	déterminante stricte	CR				*		1,0	3,0	3,4	TRFO
Cottus rondeleti	Chabot de l'Hérault	très forte	déterminante stricte	DD						0,0	2,7	3,4	TRFO
Alosa fallax rhodanensis	Alose feinte du Rhône	très forte	déterminante stricte	VU			*	*		2,5	2,8	3,0	TRFO
Salmo salar	Saumon atlantique	modérée	déterminante stricte	VU			*	*		2,5	2,3	3,4	TRFO
Parachondrostoma toxostoma	Toxostome	forte	déterminante stricte	NT				*		1,0	2,3	3,4	TRFO
Anguilla anguilla	Anguille	modérée	remarquable	CR	*					0,0	2,8	2,0	FORT
Cottus duranii	Chabot de la Dordogne	forte		DD						0,0	2,3	2,4	FORT
Barbus meridionalis	Barbeau méridional	très forte	déterminante stricte	NT			*	*		2,5	2,5	2,2	FORT
Lampetra fluviatilis	Lamproie de rivière	modérée		VU			*	*		2,5	1,3	3,4	FORT
Salaria fluviatilis	Blennie fluviatile	modérée	déterminante stricte	NT			*			1,5	2,0	2,6	FORT
Petromyzon marinus	Lamproie marine	modérée	déterminante à critères	NT			*	*		2,5	1,8	2,6	FORT
Thymallus thymallus	Ombre commun	faible	déterminante à critères	VU			*			1,5	1,8	2,6	FORT
Esox lucius	Brochet	faible	déterminante à critères	VU			*			1,5	1,8	2,4	FORT
Telestes souffia	Blageon	modérée	déterminante stricte	NT				*		1,0	2,0	2,0	FORT
Cottus gobio	Chabot	modérée	déterminante à critères	DD				*		1,0	1,7	2,0	MODE
Leuciscus burdigalensis	Vandoise rostrée	modérée	remarquable	DD						0,0	1,0	2,4	MODE
Lampetra planeri	Lamproie de planer	modérée	remarquable	LC			*	*		2,5	0,8	2,6	MODE
Phoxinus phoxinus	Vairon de Septimanie	très forte	remarquable	DD						0,0	1,7	1,4	MODE
Salmo trutta	Truite commune	faible	déterminante à critères	LC			*			1,5	1,0	1,8	MODE
Leuciscus leuciscus	Vandoise	faible	remarquable	DD			*			1,5	0,7	1,8	MODE
Gobio alvernensis	Goujon d'auvergne	modérée	remarquable	DD						0,0	1,0	1,4	MODE
Gobio occitanicus	Goujon du Languedoc	modérée	remarquable	DD						0,0	1,0	1,4	MODE
Atherina boyeri	Athérine	modérée		LC						0,0	0,5	1,6	FAIB
Gasterosteus aculeatus	Epinoche	faible	remarquable	LC						0,0	0,5	1,4	FAIB
Squalius laietanus	Chevaine catalan	faible	remarquable	DD						0,0	0,5	1,2	FAIB
Alburnus alburnus	Ablette			LC									NH
Barbus barbus	Barbeau fluviatile			LC									NH
Blicca bjoerkna	Brème bordelière			LC									NH
Abramis brama	Brème commune			LC									NH
Squalius cephalus	Chevaine			LC									NH
Platichthys flesus	Flet			DD									NH
Rutilus rutilus	Gardon			LC									NH

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des poissons présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Responsabilité régionale	Déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge France	PNA	Statut protection France		Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
						extinction	Article 1	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Gobio gobio	Goujon			DD									NH
Barbatula barbatula	Loche franche			LC									NH
Chelon labrosus	Mulet à grosses lèvres			NE									NH
Liza aurata	Mulet doré			NE									NH
Liza ramada	Mulet porc			LC									NH
Perca fluviatilis	Perche commune			LC									NH
Scardinius erythrophthalmus	Rotengle			LC									NH
Alburnoides bipunctatus	Spirlin			LC									NH
Tinca tinca	Tanche			LC									NH
Phoxinus phoxinus	Vairon			DD									NH
Cobitis taenia	Loche de rivière			VU			*	*					ABS
Barbatula quignardi	Loche de Quignard	forte	remarquable	DD						0,0			PBTAX
Leuciscus oxyrrhis	Vandoise au long-museau		remarquable	DD									PBTAX
Ctenopharyngodon idella	Amour blanc		introduite	NA									INTR
Micropterus salmoides	Black-bass, Achigan à grande bouche		introduite	NA									INTR
Rhodeus amarus	Bouvière		introduite	LC			*						INTR
Carassius gibelio	Carassin argenté		introduite	NA									INTR
Carassius carassius	Carassin commun		introduite	NA									INTR
Carassius auratus	Carassin doré		introduite	NA									INTR
Cyprinus carpio	Carpe commune		introduite	NA									INTR
Salvelinus namaycush	Cristivomer		introduite	NA									INTR
Pachychilon pictum	Epirine lippue		introduite	NA									INTR
Gambusia holbrooki	Gambusie		introduite	NA									INTR
Pomatoschistus minutus	Gobie buhotte		introduite	NE									INTR
Pomatoschistus microps	Gobie tacheté		introduite	NE									INTR
Gymnocephalus cernuus	Grémille		introduite	LC									INTR
Chondrostoma nasus	Hotu		introduite	LC									INTR
Mugil cephalus	Mulet à grosse tête		introduite	NE									INTR
Salvelinus umbla	Omble chevalier		introduite	VU			*						INTR
Lepomis gibbosus	Perche soleil		introduite	NA									INTR
Ameiurus melas	Poisson-chat		introduite	NA									INTR
Pseudorasbora parva	Pseudorasbora		introduite	NA									INTR
Sander lucioperca	Sandre		introduite	NA									INTR
Salvelinus fontinalis	Saumon de fontaine		introduite	NA									INTR
Silurus glanis	Silure		introduite	NA									INTR
Oncorhynchus mykiss	Truite arc-en-ciel		introduite	NA									INTR

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des odonates présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Responsabilité régionale	Déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge France	PNA	Statut protection France		Statut Directive habitats		notes d'enjeu			Enjeu régional LR
						Article 2	Article 3	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	
Gomphus graslinii	Gomphe de Graslin	modérée	Déterminante stricte	EN	*	*		*	*	3,0	3,3	3,0	TRFO
<i>Lestes macrostigma</i>	Leste à grands ptérostigmas	modérée	Déterminante stricte	EN	*					0,0	3,3	3,0	TRFO
Macromia splendens	Cordulie splendide	forte	Déterminante stricte	EN	*	*		*	*	3,0	3,5	2,6	TRFO
<i>Coenagrion caeruleum</i>	Agrion bleuissant	forte	Déterminante stricte	EN	*					0,0	3,5	2,4	TRFO
<i>Coenagrion lunulatum</i>	Agrion à lunules	modérée	Déterminante stricte	EN	*					0,0	3,3	2,2	FORT
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	Sympétrum déprimé	modérée	Remarquable	EN	*					0,0	2,5	2,6	FORT
<i>Somatochlora alpestris</i>	Cordulie alpestre	modérée	Déterminante stricte	VU						0,0	2,3	2,6	FORT
Coenagrion mercuriale	Agrion de Mercure	faible	Déterminante stricte	NT	*		*	*		2,0	2,5	2,0	FORT
<i>Cordulegaster bidentata</i>	Cordulégastré bidenté	modérée	Déterminante stricte	VU						0,0	2,3	2,2	FORT
Oxygastra curtisii	Cordulie à corps fin	faible	Déterminante stricte	VU	*	*		*	*	3,0	2,8	1,6	FORT
<i>Coenagrion hastulatum</i>	Agrion à fer de lance	modérée	Déterminante stricte	VU						0,0	2,3	2,0	FORT
<i>Gomphus flavipes</i>	Gomphe à pattes jaunes	modérée		EN	*	*			*	2,5	2,3	1,8	FORT
<i>Aeshna juncea</i>	Aesche des joncs	modérée	Déterminante stricte	NT						0,0	2,0	2,0	FORT
<i>Somatochlora arctica</i>	Cordulie arctique	modérée	Remarquable	VU						0,0	1,5	2,4	MODE
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	Sympétrum du Piémont	modérée	Déterminante stricte	VU						0,0	2,3	1,6	MODE
<i>Gomphus simillimus</i>	Gomphe semblable	faible	Déterminante stricte	NT						0,0	1,8	1,8	MODE
<i>Lestes dryas</i>	Leste des bois	modérée	Déterminante stricte	NT						0,0	2,0	1,4	MODE
<i>Onychogomphus uncatus</i>	Gomphe à crochets	modérée	Déterminante stricte	NT						0,0	2,0	1,4	MODE
<i>Sympetrum flaveolum</i>	Sympétrum jaune d'or	faible	Déterminante stricte	VU						0,0	2,0	1,0	MODE
<i>Leucorrhinia dubia</i>	Leucorrhine douteuse	modérée	Remarquable	NT						0,0	1,3	1,6	MODE
<i>Somatochlora metallica</i>	Cordulie métallique	modérée	Déterminante stricte	NT						0,0	2,0	0,8	MODE
<i>Ischnura pumilio</i>	Agrion nain	faible	Déterminante stricte	NT						0,0	1,8	1,0	MODE
<i>Aeshna grandis</i>	Grande Aesche	modérée	Remarquable	NT						0,0	1,3	1,4	MODE
<i>Sympetrum danae</i>	Sympétrum noir	modérée	Remarquable	NT						0,0	1,3	1,4	MODE
<i>Libellula fulva</i>	Libellule fauve	faible	Déterminante stricte	LC						0,0	1,3	1,2	MODE
<i>Coenagrion scitulum</i>	Agrion mignon	faible	Remarquable	NT						0,0	1,0	1,4	MODE
<i>Lestes barbarus</i>	Leste sauvage	faible	Remarquable	NT						0,0	1,0	1,4	MODE
<i>Aeshna isocetes</i>	Aesche isocète	faible		VU						0,0	1,0	1,2	MODE
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Gomphe vulgaire	modérée		NT						0,0	1,0	1,2	MODE
<i>Lestes virens virens</i>	Leste verdoyant septentrional	modérée		NT						0,0	1,0	1,2	MODE

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des odonates présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Responsabilité régionale	Déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge France	PNA	Article 2	Article 3	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	Enjeu régional LR
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	Cordulie à taches jaunes	modérée		NT						0,0	1,0	1,2	MODE
<i>Onychogomphus forcipatus unguiculatus</i>	Gomphe à forceps méridional	forte		LC						0,0	0,8	1,4	MODE
<i>Coenagrion pulchellum</i>	Agrion joli	faible	Remarquable	NT						0,0	1,0	1,0	MODE
<i>Lestes virens vestalis</i>	Leste verdoyant méridional	modérée		NT						0,0	1,0	1,0	MODE
<i>Sympetrum vulgatum</i>	Sympétrum vulgaire	modérée		NT						0,0	1,0	1,0	MODE
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>	Caloptéryx hémorroïdal	modérée	Remarquable	LC						0,0	0,8	1,2	MODE
<i>Lestes sponsa</i>	Leste fiancé	modérée	Remarquable	LC						0,0	0,8	1,2	MODE
<i>Platycnemis acutipennis</i>	Agrion orangé	faible		NT						0,0	0,8	0,8	FAIB
<i>Ceragrion tenellum</i>	Agrion délicat	faible	Remarquable	LC						0,0	0,5	1,0	FAIB
<i>Erythromma viridulum</i>	Naïade au corps vert	faible	Remarquable	LC						0,0	0,5	1,0	FAIB
<i>Aeshna affinis</i>	Aeschne affine	faible	Remarquable	LC						0,0	0,5	0,8	FAIB
<i>Sympetrum meridionale</i>	Sympétrum méridional	faible	Remarquable	LC						0,0	0,5	0,4	FAIB
<i>Aeshna cyanea</i>	Aeschne bleue	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Aeshna mixta</i>	Aeschne mixte	faible		LC						0,0	0,3	0,2	NH
<i>Anax imperator</i>	Anax empereur	faible		LC						0,0	0,3	0,2	NH
<i>Anax parthenope</i>	Anax napolitain	faible		LC						0,0	0,3	0,8	NH
<i>Boyeria irene</i>	Aeschne paisible	faible		LC						0,0	0,3	1,0	NH
<i>Brachytron pratense</i>	Aeschne printanière	modérée		LC						0,0	0,5	1,4	NH
<i>Calopteryx splendens caprai</i>	Caloptéryx de Capra	modérée		LC						0,0	0,5	1,4	NH
<i>Calopteryx splendens splendens</i>	Caloptéryx éclatant	modérée		LC						0,0	0,5	0,8	NH
<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>	Caloptéryx vierge méridional	modérée		LC						0,0	0,5	0,8	NH
<i>Calopteryx virgo virgo</i>	Caloptéryx vierge septentrional	modérée		LC						0,0	0,5	0,6	NH
<i>Calopteryx xanthostoma</i>	Caloptéryx occitan	modérée		LC						0,0	0,5	1,0	NH
<i>Chalcolestes viridis viridis</i>	Leste vert	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Coenagrion puella</i>	Agrion jouvencelle	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>	Cordulégastré annelé	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Cordulegaster boltonii immaculifrons</i>	Cordulégastré à front jaune	modérée		LC						0,0	0,5	1,4	NH
<i>Cordulia aenea</i>	Cordulie bronzée	modérée		LC						0,0	0,5	0,6	NH
<i>Crocothemis erythraea</i>	Crocothémis écarlate	faible		LC						0,0	0,3	0,2	NH
<i>Enallagma cyathigerum</i>	Agrion porte-coupe	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Erythromma lindenii</i>	Agrion de Vander Linden	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Erythromma najas</i>	Naïade aux yeux rouges	modérée		LC						0,0	0,5	1,4	NH
<i>Gomphus pulchellus</i>	Gomphe joli	faible		LC						0,0	0,3	0,8	NH

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PB TAX : Problème de Taxonomie

Hiérarchisation des odonates présents en Languedoc-Roussillon

Version 1 - février 2013

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Responsabilité régionale	Déterminance ZNIEFF LR	Liste rouge France	PNA	Article 2	Article 3	Annexe II	Annexe IV	juridique	responsabilité	sensibilité	Enjeu régional LR
<i>Ischnura elegans</i>	Agrion élégant	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Libellula depressa</i>	Libellule déprimée	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Libellule quadrimaculée	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Onychogomphus forcipatus forcipatus</i>	Gomphe à forceps septentrional	modérée		LC						0,0	0,5	0,6	NH
<i>Orthetrum albistylum</i>	Orthétrum à stylets blancs	modérée		LC						0,0	0,5	0,2	NH
<i>Orthetrum brunneum</i>	Orthétrum brun	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Orthétrum réticulé	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Orthetrum coerulescens</i>	Orthétrum bleuissant	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Platycnemis latipes</i>	Agrion blanchâtre	faible		LC						0,0	0,3	1,0	NH
<i>Platycnemis pennipes</i>	Agrion à larges pattes	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Pyrrosoma nymphula</i>	Petite nymphe au corps de feu	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Sympecma fusca</i>	Leste brun	faible		LC						0,0	0,3	1,0	NH
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	Sympétrum de Fonscolombe	faible		LC						0,0	0,3	0,4	NH
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Sympétrum sanguin	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH
<i>Sympetrum striolatum</i>	Sympétrum fascié	faible		LC						0,0	0,3	0,6	NH