

## Fiche espèce N° 28

# Rollier d'Europe

*Coracias garrulus*

Code Natura 2000 : A 231

## Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I  
Convention de Berne : Annexe II  
Convention de Bonn : Annexe II  
Statut européen : en déclin  
Liste rouge nationale : rare  
Liste rouge LR : stable

## Description de l'espèce

De la taille d'un geai, le Rollier d'Europe se distingue aisément par sa livrée bleu turquoise. L'aile est bordée de brun noir et le haut du dos et les scapulaires sont brun roux. Voix rauque de corvidés : "Rak-rak-rak..." en vol ou posé.



## Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

## Distribution et tendance en France et en LR

En limite Nord Ouest de son aire de répartition, sa présence est quasiment limitée aux régions PACA et LR. Si l'espèce est en déclin sur le reste de son aire de répartition, ce n'est pas le cas en France. La région LR compte à elle seule plus de 60% de la population française et l'Aude environ 10% avec 40 à 50 couples recensés.

## Ecologie

- Habitat : mosaïque de milieux, végétation basse et sèche avec de nombreux postes d'affût et des arbres creux.
- Alimentation : gros insectes en quantité (orthoptères et coléoptères principalement) et à l'occasion d'autres invertébrés et de petits amphibiens ou reptiles.
- Reproduction : niche dans des cavités naturelles, dans d'anciennes loges de pic mais aussi assez facilement dans des nichoirs artificiels. [mai-juillet]
- Migration : hiverne en Afrique orientale à partir de la mi-août jusqu'à début avril.

## Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Nicheur strict	? / 2	? / 2

## Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

### ❖ Etat de conservation

Un couple a probablement niché en 2004 dans la plaine de Narbonne. C'est une des rares données du littoral audois. A ce stade, il est difficile d'établir une tendance pour les effectifs de cette espèce. On peut aussi noter des observations régulières d'oiseaux en migration stationnant sur le site (ces effectifs ne dépassent pas 10 oiseaux à la fois mais représentent jusqu'à 80 individus observés en migration active sur une année).

### ❖ Caractéristique de l'habitat

L'espèce niche sur le Labrador où elle trouve les prairies de fauche, les pâturages et les friches pour son alimentation et vraisemblablement une cavité pour nicher. La présence de linéaires arborés et de Pivert sur la zone pourrait lui fournir d'anciennes loges où nicher. **[Carte 15.1]**

### ❖ Menaces

- La disparition de ses zones de chasse par la fermeture du milieu;
- La disparition des haies et des vieux arbres où il niche et se place en affût;
- Les pratiques de cultures intensives et notamment l'utilisation de produits phytosanitaires ou celle de vermifuge sur le bétail, qui limitent le nombre d'insectes disponibles pour son alimentation.

### ❖ Mesures de gestion

- Maintenir des espaces ouverts par le pâturage;
- Conserver un maximum de vieux arbres;
- Installer des nichoirs artificiels en hauteur;
- Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et apporter les soins vétérinaires hors champs afin de limiter l'effet des insecticides contenus dans les sels.

### ❖ Interaction avec d'autres espèces

Ces mesures sont aussi favorables à d'autres grands insectivores comme la Huppe fasciée, la Chevêche d'Athéna et les Pies-grièches sp.