

Cochevis de Thékla

Galerida theklae

Code Natura 2000 : A 245

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Statut européen : vulnérable
Liste rouge nationale : vulnérable
Liste rouge LR : rare

Description de l'espèce

Très proche du Cochevis huppé, il s'en distingue par un bec plus court, des rayures pectorales plus marquées et le dessus de la queue roussâtre contrastant avec le croupion. Comme la plupart des alouettes, cette espèce peut facilement passer inaperçue quand elle est au sol.



Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Ecologie

- Habitat : végétation herbeuse rase sur substrat calcaire tel les pelouses à Brachypode rameux.
- Alimentation : graines en hiver et petits insectes capturés au sol en été.
- Reproduction : niche au sol, sous une touffe d'herbe. [février-juillet]
- Migration : L'espèce est très sédentaire et l'on observe un comportement plus grégaire en mauvaise saison. Reste dans un périmètre de 500m de son site de reproduction tout au long de l'année.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Nicheur strict	-	8

Distribution et tendance en France et en LR

En limite Nord de l'aire de répartition de l'espèce, les Corbières orientales représentent le seul bastion français de l'espèce avec plus de 300 couples recensés (Gonin J., 2003). Aucune tendance ne peut être dégagée des rares renseignements sur cette population. Au vu du déclin observé dans la population espagnole, une attention plus grande devra être portée à l'évolution du noyau français de l'espèce.

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

Aucun couple de Cochevis de Thékla n'est signalé sur ce site.

❖ Caractéristique de l'habitat

Aucune.

❖ Menaces

Aucune.

❖ Mesures de gestion

Aucune.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Aucune.

Bilan sur le complexe lagunaire de La Palme

❖ Etat de conservation

Le site est situé en bordure Est de l'aire de répartition de la population française de l'espèce, et 4 couples ont récemment été trouvés sur le plateau de La Palme. Aucune tendance ne peut être dégagée.

❖ Caractéristique de l'habitat

L'espèce fréquente les pelouses à Brachypode rameux ainsi que les garrigues basses présentes sur le Plateau de La Palme en été et en hiver, les vignes enherbées à proximité. **[Carte 32.5]**

❖ Menaces

- La fermeture du milieu liée à la déprise agricole et aux reboisements effectués récemment sur le plateau;
- Le débroussaillage en période de nidification;
- La disparition de ses biotopes de prédilection suite à des constructions ou des aménagements du territoire.

❖ Mesures de gestion

- Limiter la plantation de pinède;
- Favoriser les activités agricoles permettant un maintien de l'ouverture du milieu (pâturage extensif);
- Effectuer les travaux de débroussaillage (DFCI) en automne-hiver;
- Limiter les aménagements sur les zones de nidification actuelles et potentielles.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Cette gestion est favorable à de nombreuses autres espèces comme l'Engoulevent d'Europe, la Fauvette pitchou et le Bruant ortolan (mais aussi au Traquet oreillard, espèce non citée en annexe I).