

Fiche espèce N° 40

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Code Natura 2000 : A 302

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe IConvention de Berne : Annexe IIStatut européen : vulnérableListe rouge national : à surveillerListe rouge LR : non précisé

Description de l'espèce

Petite fauvette avec une longue queue souvent relevée; extrêmement vive elle peut facilement passer inaperçue. Plumage : dessus gris foncé, dessous lie-de-vin terne avec la gorge finement ponctuée de blanc et milieu du ventre blanc sale. La femelle est plus brune dessus et moins colorée dessous.



Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce occupe la moitié Sud-ouest de la France. Bien que les effectifs soient mal connus, il semble qu'ils soient stables (à la différence des populations européennes qui régressent du fait de la dégradation de leur habitat). Les effectifs et les tendances de l'espèce ne sont pas connus précisément; différentes études ponctuelles donnent une moyenne de 0,1 à 0,2 couples/ha dans les garrigues méditerranéennes.

Ecologie

- Habitat : garrigues et landes à ligneux sempervirents bas et denses en bordure de pelouses.
- Alimentation : insectes de petite taille, araignées et baies en automne.
- Reproduction : mâle et femelle construisent un nid dans la végétation. La femelle y pond en moyenne 4 oeufs. [mars-mai]
- Migration : L'espèce est principalement sédentaire mais peut effectuer de petits déplacements hivernaux pour s'alimenter en plaine ou sur la frange littorale.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Nicheur strict	? / 36	? / (40)

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

La Fauvette pitchou est bien présente sur les garrigues du site. Les effectifs exacts ainsi que leurs tendances ne sont pas connues (la date tardive de l'inventaire 2004 n'a pas permis de contacter tous les reproducteurs). 18 couples seulement ont pu être recensés; il est vraisemblable que l'effectif soit supérieur. Elle est plus fréquente sur les contreforts des Corbières.

❖ Caractéristique de l'habitat

Elle exploite pour nicher les garrigues présentes sur l'île Saint Martin, le cirque de l'étang du Doul et l'île étroite (au sud de Peyriac). Les habitats similaires observés sur Foncaude au Nord de l'étang de Gruissan sont favorables à sa présence. En hiver, les populations locales (auxquelles peuvent s'ajouter des groupes d'individus provenant des Corbières ou du Massif de la Clape) fréquentent les friches et les sansouires proches.

[Cartes 17.1 à 17.4]

❖ Menaces

- La fermeture du milieu et plus particulièrement les plantations forestières;
- Le débroussaillage en période de nidification.

❖ Mesures de gestion

- Limiter la plantation de couvert arboré dense et monospécifique;
- Effectuer les travaux de débroussaillage (DFCI) en automne-hiver.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Cette gestion est favorable à l'ensemble des espèces de garrigue à faible recouvrement de ligneux bas (Engoulevent d'Europe, ...).