

Fiche espèce N° 44

Cigogne noire

Ciconia nigra

Code Natura 2000 : A 030

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Statut européen : vulnérable
Liste rouge national : vulnérable
Liste rouge LR : migrateur rare

Description de l'espèce

Se distingue de la Cigogne blanche par sa tête, son cou et son dos entièrement noir. Grand bec et pattes rouges. En vol : cou tendu et pattes dépassant du corps. De dessous, seul le bas du corps et les aisselles sont blanches. Dessus entièrement noir. Plus discrète et moins abondante que la cigogne blanche.

Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

Après une période de déclin en Europe, on observe une expansion de l'aire de répartition vers l'ouest. L'espèce niche à nouveau en France en 1973. On dénombre actuellement entre 20 et 40 couples dans une bande joignant l'Alsace à la région Poitou-Charentes. En LR, la cigogne noire est un migrateur régulier et certains individus marquent une halte dans les marais du littoral.



Ecologie

- Habitat : vastes zones forestières à proximité de zones humides (marais, prairies inondées et cours d'eau).
- Alimentation : poissons, amphibiens, micromammifères et grands insectes, se rapprochant en cela du comportement du héron cendré.
- Reproduction : nichent préférentiellement sur de vieux arbres en haut d'une pente en France mais peut aussi nicher sur des falaises comme dans la péninsule ibérique. Fidélité supposée au site. [avril-août]
- Migration : passage pré-nuptial fin mars et passage post-nuptial à partir de la mi-juillet. Migrent en famille, par petits groupes ou isolés. Passent plutôt à l'intérieur des terres.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Migration automne	27 - 70 / 27	id
Hivernant	? / 1	-

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

La Cigogne noire ne fait normalement que passer en migration au dessus de Bages-Sigean avec des effectifs plus importants en automne (60 individus en moyenne) qu'au printemps (15 individus en moyenne). Quelques individus isolés stationnent la nuit sur les marais. En 2004, un juvénile semble vouloir hiverner sur la plaine de Narbonne.

❖ Caractéristique de l'habitat

L'espèce fréquente en halte migratoire les prairies, et les zones de culture inondées de l'ancien étang du Cercle, du Grand Castelou et les rizières de Mandirac et du Grand Tournebelle.

❖ Menaces

- Les risques de collision ou d'électrocution avec le réseau électrique aérien;
- L'utilisation intensive de produit phytosanitaire et de vermifuge pour le bétail;
- L'abandon des pratiques de submersion des pâturages.

❖ Mesures de gestion

- Enterrer ou protéger le réseau électrique;
- Favoriser des pratiques agricoles raisonnées et mettre en parc les animaux vermifugés;
- Inonder les pâtures et les prairies de fauche en automne-hiver.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Ces mesures sont aussi favorables aux anatidés hivernant, aux Grues cendrées et aux Cigogne blanche fréquentant la zone lors de leur migration.