

Fiche espèce N° 45

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Code Natura 2000 : A 034

Statut et protection


Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Statut européen : en danger
Liste rouge nationale : vulnérable
Liste rouge LR : non défini

Description de l'espèce

La Spatule blanche est un grand échassier blanc qui ne peut être confondu de près, du fait son long bec spatulé. L'adulte en plumage nuptiale a le bout du bec jaune et présente des taches ocrées à la poitrine et sur la gorge. Le juvénile est entièrement blanc excepté les pointes noires des rémiges; son bec et ses pattes sont plus ou moins pâles selon l'âge. En vol, l'espèce garde le coup tendu à la différence des autres échassiers blancs.



Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce est citée nicheuse rare en France avant les années 90, depuis les effectifs ont augmenté pour atteindre environ 50 couples répartis uniquement en Loire atlantique et en Gironde. L'ensemble du littoral atlantique accueille aussi des oiseaux en hivernage. En LR, la Spatule est observée régulièrement en période de migration et occasionnellement en hivernage.

Ecologie

- Habitat : vasières et zones faiblement inondées sans végétation haute à proximité.
- Alimentation : crevettes, larves d'insectes et plus rarement de petits poissons.
- Reproduction : niche uniquement dans des arbres et le plus souvent dans des héronnières. [avril-août]
- Migration : hiverne en grande partie en Afrique et principalement sur le Banc d'Arguin en Mauritanie.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean
Migrateur	2 - 6 / 6
Hivernant	0 - 2 / 1

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

La Spatule blanche semble observée de plus en plus régulièrement ce qui pourrait être la conséquence des politiques de gestion et de protection de l'espèce au niveau européen.

❖ Caractéristique de l'habitat

Elle stationne fréquemment sur les rizières inondées aux alentours de Mandirac mais elle a aussi été observée dans les salins de Gruissan, au Marais de Saint-Louis et sur les étangs de Campagnol et de l'Ayrolle. Ces zones ont comme caractéristiques communes la présence de surface d'eau libre de faible hauteur et surtout leur relative tranquillité.

❖ Menaces

Non définie

❖ Mesures de gestion

- Augmenter les pratiques d'inondation hivernale des parcelles agricoles.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Cette gestion est favorable à l'ensemble des espèces d'ardéidés, d'anatidés et de limicoles migrateurs et hivernants sur le site.