

ZPS BASSE VALLEE DE L'AUDE

Espèces animales remarquables

Guifette moustac

Chlidonias hybrida

PROTECTION

Espèce protégée en France
Annexe II (Conv. de Berne)
Annexe I Directive Oiseaux

LIVRE ROUGE

A Surveiller

DETERMINANTE ZNIEFF

NON



X. RUFRAY

Généralités

DESCRIPTION

Petite Sterne ressemblant à la Sterne pierregarin, mais, en plumage nuptial, avec un ventre quasiment noir.

DISTRIBUTION

Languedoc-Roussillon : Nicheur occasionnel, Hivernage : 200 à 300 individus

France : 2 300 à 2 400 couples

ECOLOGIE


La dernière nidification dans la région remonte à 1992 sur l'étang de Capestang (Hérault). Depuis, des tentatives d'installations ont été notées sur l'étang du Crey (Gard) et sur l'étang de Vendres (Hérault).

L'espèce est essentiellement migratrice, parfois abondante au printemps. La région abrite l'unique population hivernante française, originalité pour cette espèce qui hiverne traditionnellement en Afrique de l'Ouest.

L'espèce construit son nid sur la végétation flottante des marais et des étangs. La ponte de trois oeufs a lieu à la fin mai et au début de juin. L'incubation dure 18 à 20 jours et l'élevage des jeunes environ 23 jours (jusqu'à leur envol).

Elle se nourrit principalement d'insectes (adultes et larves), petits poissons et amphibiens.

ZPS Basse Vallée de l'Aude



SITES DE REPRODUCTION

L'espèce peut potentiellement se reproduire sur l'étang de Vendres.
A Suivre dans les années à venir

MIGRATION

L'espèce est commune d'avril à juin sur l'étang de Vendres avec des effectifs dépassant parfois la centaine d'individus. Elle est bien présente également sur le lagunage et les roselières de Pissevaches

Menaces et gestion

FACTEURS DE MENACES

En migration, aucune menace réellement identifiée

CONSERVATION

Le développement des herbiers aquatiques permettrait de favoriser sa reproduction