

Fiche espèce N° 12

Sterne caugek

Sterna sandvicensis


Code Natura 2000 : A 191

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Statut européen : en déclin
Liste rouge nationale : localisé
Liste rouge LR : localisé

Description de l'espèce

La Sterne caugek est une grande Sterne remarquable par son long bec noir avec une pointe jaune. L'adulte est gris clair sur le dessus et blanc sur le dessous. En période nuptiale, il présente une calotte entièrement noire avec une huppe ébouriffée en arrière du crâne. En période internuptiale, cette calotte s'éclaircit et le front est blanc. Le juvénile a des motifs écailleux sur les ailes. Cri en vol typique : "kririèèk!".



Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

Suivant la redistribution des oiseaux issus des colonies néerlandaises désertées suite à une pollution des eaux, dans es années 1960, les effectifs de Sterne caugek sont passés de 3000 couples (1959) à 7000 minimum dès 1990. En LR, sa nidification est localisée sur 2 sites dans l'Hérault et dans l'Aude avec d'importantes variations interannuelles. Le littoral languedocien accueille de grands groupes d'individus en période de migration.

Ecologie

- Habitat : îlots sableux du littoral sans végétation ou recouverts d'une végétation rase.
- Alimentation : pêche en mer ou plus rarement en lagune, principalement des sardines, sprats, anchois et lançons.
- Reproduction : niche en colonie le plus souvent mixte avec d'autres laridés et sternidés. [mai-août]
- Migration : les populations européennes se dispersent sur tout le littoral et une partie de celles-ci peuvent hiverner sur le littoral d'Afrique du Nord et de l'Ouest.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean
Hivernant	50
Migrateur	450

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ **Etat de conservation**

La Sterne caugek peut être observée toute l'année sur le site mais les pics de présence se font en période de migration pré-nuptiale (avril-mai). Les effectifs observés subissent de fortes variations interannuelles.

❖ **Caractéristique de l'habitat**

Elle exploite l'ensemble des lagunes et du littoral maritime du site pour pêcher en toute saison et stationne sur des îlots ou des marges lagunaires exondées. [Cartes 11.1 à 11.4]

❖ **Menaces**

- La pollution des eaux diminuant les ressources alimentaires de l'espèce ;
- Le dérangement sur les sites de reproduction.

❖ **Mesures de gestion**

- Favoriser une agriculture moins consommatrice de produits phytosanitaires, faire laguner les eaux de colatures et se prévenir de pollutions industrielles.

❖ **Interaction avec d'autres espèces**

Cette gestion est favorable à l'ensemble des espèces de Sternidés et de Laridés migratrices et nicheuses sur le site.