

Fiche espèce N° 25

Lusciniole à moustaches

Acrocephalus melanopogon


Code Natura 2000 : A 293

Statut et protection

Directive Oiseaux: Annexe I
Convention de Berne: Annexe II
Statut européen: (à surveiller)
Liste rouge nationale: rare
Liste rouge LR: stable

Description de l'espèce

Petit passereau insectivore reconnaissable par son sourcil blanc cassé bien marqué contrastant avec sa calotte brun sombre. Plumage : dessus brun roux, dessous blanc devenant ocre sale sur les flancs et la poitrine. Pattes et bec noir. Chant complexe rappelant celui de la Rousserolle effarvate en plus doux avec la présence de sifflements initiaux rappelant le Rossignol philomène.



Ecologie

- Habitat: phragmitaies avec présence d'une strate basse (scirpe, marisque ou carex) et d'une litière composé de vieilles tiges des années précédentes.
- Alimentation: petits invertébrés recueillis à la surface de l'eau et à la base de la végétation.
- Reproduction: nid de jeunes pousses de roseaux et laïches, construit à la base de la végétation dans un entrelacs de vieille tiges. [mars-juillet]
- Migration: sédentaire pour les populations méridionales. Ces sites de nidification méridionaux accueillent les oiseaux en migration et en hivernage.

Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

En France la quasi-totalité des effectifs niche dans les roselières du littoral méditerranéen en région LR et en Camargue. Ces effectifs sont estimés à 1000 à 2000 couples et semblent en recul du fait de la diminution de leurs habitats.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Nicheur strict	8 - 16 / 8	? / 4

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

L'espèce est mal connue numériquement. Les contacts essentiellement sonores peuvent prêter à confusion avec la Rousserolle effarvatte. L'espèce étant sédentaire sur le site, cette confusion peut être exclue en effectuant les recensements en février-mars, dates auxquelles les Rousserolles ne sont pas encore de retour d'hivernage. 4 à 8 couples sont notés chaque année sans tendance définie mais l'on peut supposer que ces effectifs sont plus importants : 10 à 20 couples.

❖ Caractéristique de l'habitat

La Lusciniole à moustaches préfère les vieilles roselières peu denses. Les vieilles tiges contiennent de nombreuses larves qui fournissent une source d'alimentation hivernale pour ce petit passereau paludicole. On la rencontre donc sur les roselières de Saint Louis, du Petit Castelou, et en moindre mesure celle de l'ancien étang du Cercle et du Pont des Olieux. **[Cartes 14.1 à 14.4]**

❖ Menaces

- La régression des grandes surfaces de roselière;
- Le faucardage intensif des roselières (il suffit d'une coupe intensive pour anéantir des années de bonne gestion préalable);
- Les actions de démoustication par engin à chenillettes qui peuvent déranger ou détruire des nichées.

❖ Mesures de gestion

- Créer de nouvelles roselières et gestion améliorée des surfaces déjà colonisées;
- Faucarder une moitié maximum de leur surface chaque année et si possible en mosaïque;
- Limiter les actions de démoustication par engin à chenillette sur les roselières concernées.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Ces mesures sont favorables aux autres espèces d'oiseaux d'eau (Butor étoilé, Héron cendrée, Canards,...), au Busard des roseaux et aux passereaux paludicoles (Lusciniole à moustache, Gorgebleue à miroir, Rousserole turdoïde, ...).