

Fiche espèce N° 27

Oedicnème criard

Burhinus oediconemus

Code Natura 2000 : A 133


Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Statut européen : vulnérable
Liste rouge nationale : en déclin
Liste rouge LR : vulnérable

Description de l'espèce

Passant souvent inaperçu car totalement mimétique dans son milieu et aux mœurs nocturnes. De la taille d'un gros pigeon, corps allongé. Grand œil jaune et bec fort à bout noir. Dessus brun gris fauve rayé de noir, bande blanchâtre sur l'aile. Ventre blanc. En vol, bande alaire blanchâtre bien visible, rémiges primaires noires avec motifs blancs. Très bruyant lors de la nidification avec un "courr-lîh" répété et modulé à l'infini.

Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

En déclin en Europe occidentale, l'espèce est encore bien représentée en Espagne et en France. En déclin au nord du pays, elle se maintient dans les plaines agricoles du Centre-Ouest. En LR, les faibles effectifs (quelques centaines de couples) semblent se maintenir sauf dans le Gard où ils sont en déclin. Distribuée essentiellement en plaine de l'Aude où les effectifs sont encore mal connus



Ecologie

- Habitat : 3/4 des effectifs utilisent les terres cultivées sur terrains secs ou caillouteux. Milieux naturels : steppes méridionales, anciens lits de rivière.
- Alimentation : éclectiques. Insectes divers, araignées, vers, petits reptiles et micromammifères de temps en temps. Le tout capturé au sol durant la nuit.
- Reproduction : niche en colonies lâches dans un milieu sec et découvert. Nid représenté par une simple cuvette que les jeunes quittent quelques heures après leur éclosion. [avril-juin]
- Migration : prémices en août avec le rassemblement en bandes à proximité des sites de nidification. Déplacements nocturnes avec de nombreuses haltes discrètes vers l'Afrique du Nord et subsaharienne. Retour début mars. (Quelques hivernants notés en LR)

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Nicheur strict	4 - 20 / 4	6 - 10 / -
Migrateur	0 - 2 / 0	?

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

2 à 10 couples nichent sur le site de Bages-Sigean. Des prospections nocturnes plus précises devraient en affiner le nombre exact et surtout les tendances de ces populations récemment découvertes (2002).

❖ Caractéristique de l'habitat

L'espèce niche uniquement dans la plaine agricole au Sud de Narbonne : Ancien étang du Cercle, Quatorze, Garrigue de Saint-Laurent et Monfort. Ces sites ont en commun la présence de vignes non labourées et de friches au sol sec et caillouteux. [Carte 15.1]

❖ Menaces

- L'utilisation intensive de produits phytosanitaires qui diminue le nombre de proies disponibles;
- Le labour des friches ou des vignes en période de reproduction (avril-juin);
- L'inondation de ces parcelles en période de nidification;
- La fauche des prairies et des friches avant le mois de juin.

❖ Mesures de gestion

- Favoriser une agriculture moins intensive avec diminution des traitements chimiques;
- Limiter le nombre de passages d'engins agricoles sur les parcelles colonisées par l'espèce;
- Faucher les friches et les bordures de parcelles après la fin juin et de façon centrifuge pour ne pas piéger la faune présente.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Ces mesures sont favorables à la reproduction de nombreux passereaux (Alouette lulu, Cochevis huppé, ...) et Gallinacés (Perdrix rouges et Faisan).