

## Fiche espèce N° 38

## Engoulevent d'Europe

*Caprimulgus europaeus*


Code Natura 2000 : A 224

## Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe IConvention de Berne : Annexe IIStatut européen : en déclinListe rouge national : à surveillerListe rouge LR : non précisé

## Description de l'espèce

Oiseau de taille moyenne présentant un plumage brunâtre finement ciselé lui permettant d'être parfaitement camouflé au sol ou sur une branche d'arbre en journée. De mœurs crépusculaire et nocturne, on identifie sa présence par son ronronnement continu et sonore rappelant le bruit lointain d'une moto. Il présente une cavité buccale démesurée et des vibrisses aux commissures lui permettant de capturer des insectes en vol.



## Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

## Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire national avec un gradient d'abondance croissant du Nord au Sud. Les régions méditerranéennes dont la région LR accueillent une part importante de l'effectif national (20 000-50 000 couples). Ces populations semblent stables. Le département de l'Aude accueille à lui seul entre 1000 et 1500 couples au minimum.

## Ecologie

- Habitat : végétation basse clairsemée avec des placettes de sol nu et quelques arbres comme postes de chant.
- Alimentation : tout insecte volant dont les lépidoptères nocturnes sur lesquels il ne souffre d'aucune concurrence (mis à part les chiroptères).
- Reproduction : niche à même le sol sans apport de matériaux. [avril-juillet]
- Migration : les déplacements nocturnes commencent à la mi-juillet pour gagner l'Afrique tropicale orientale. Retour fin avril dans nos régions.

## Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean	La Palme
Nicheur strict	? / 16	?

## Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

### ❖ Etat de conservation

L'Engoulevent d'Europe est présent sur les quelques milieux typiques de l'espèce. L'effectif n'est pas connu précisément (cela demanderait de nombreuses écoutes crépusculaires). On peut estimer celui-ci à une vingtaine de couples minimum dans le périmètre prédéfini et sûrement beaucoup plus avec toutes les bordures collinaires du site. Aucune tendance n'est connue.

### ❖ Caractéristique de l'habitat

L'espèce exploite les quelques reliefs calcaires thermophiles de la zone : le Sud de l'Île Saint-Martin (7 chanteurs en 2004) et le Nord de l'étang du Doul (1 individu trouvé mort sur la route en période de nidification).

[Cartes 17.1 à 17.2]

### ❖ Menaces

- Le débroussaillage en période de nidification;
- La fermeture du milieu (homogénéisation);
- L'utilisation intensive de produit phytosanitaire dans les parcelles agricoles attenantes (zone de chasse);
- Le trafic routier sur les zones de chasse nocturne.

### ❖ Mesures de gestion

- Effectuer les travaux de débroussaillage (DFCI) en automne-hiver;
- Favoriser une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.

### ❖ Interaction avec d'autres espèces

Cette gestion est favorable à l'ensemble des espèces de garrigue à faible recouvrement de ligneux bas (Fauvette pitchou, ...).