

## Fiche espèce N° 50

## Grue cendrée

*Grus grus*

Code Natura 2000 : A 127


## Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I  
Convention de Berne : Annexe II  
Convention de Bonn : Annexe II  
Statut européen : vulnérable  
Liste rouge nationale : vulnérable  
Liste rouge LR : (migrateur régulier)

## Description de l'espèce

Grand échassier aux longues pattes et au long cou. Plumage gris sombre uniforme. Le dos souvent teinté de brun roux en été. Adultes : petite calotte rouge au sommet du crâne, tête et cou noir excepté une bande blanche partant à l'arrière de l'œil et descendant sur le cou, panache de plumes sombres à l'arrière du corps. En vol : cou tendu et pattes dépassant largement du corps, rémiges noirâtres. Juvéniles : plus terne sans motifs sur la tête qui est rousse. Bruyante, surtout en vol.

## Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

## Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce nichait autrefois en Espagne et en Aquitaine. Actuellement, avec 3 couples nicheurs dans le Nord du pays, la population française est en limite occidentale de l'aire de reproduction de l'espèce. En revanche, la France joue un rôle essentiel dans l'accueil des migrateurs et des hivernants. La région LR reste en marge de la voie migration NE-SO, mais les observations de groupes en migration active voire en halte ne sont pas rares.



## Ecologie

- Habitat : steppes de culture, prairies et marais plus ou moins dégarnis d'arbre. Fréquentation constante, d'année en année, si le site ne subit pas d'altération.
- Alimentation : essentiellement végétale, déterminée principalement par la situation et la nature des lieux de gagnage très restreints et complétée par de petites proies animales passant à sa portée. Peut à l'occasion se nourrir essentiellement de lombrics.
- Reproduction : nid rudimentaire fait de débris végétaux arrachés aux alentours et souvent situé dans une zone inondée peu fréquentée par l'Homme. Grande fidélité du couple. [mars-août]
- Migration : débute fin août par le regroupement de milliers d'individus en des zones traditionnelles de rendez-vous. Ces groupes gagnent leurs zones d'hivernage situées en France et en Espagne en effectuant de nombreuses haltes. Le retour de printemps (février - mars) est plus rapide.

## Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

|           | Bages - Sigeant |
|-----------|-----------------|
| Migrateur | 11 - 402 / 100  |
| Hivernant | 1 - 7 / 6       |

## Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

### ❖ Etat de conservation

Le site est favorable à l'hivernage de l'espèce et à son stationnement en cours de migration. Hivernage connus en 1998 (2 individus), 2000 (1 individu), 2002 (7 individus), 2003 (1 individu) et 2004 (6 individus).

### ❖ Caractéristique de l'habitat

Les principales zones fréquentées sont les phragmitaies coupées, les champs de céréales et les pâtures inondées de l'ancien étang du Cercle et les marais au Nord de l'étang de Campagnol.

### ❖ Menaces

- La salinisation progressive des annexes lagunaires;
- Les lignes électriques à proximité;

### ❖ Mesures de gestion

- Favoriser les pratiques d'inondation hivernale des cultures et des prairies;
- Augmenter les volumes d'eau douce apportés à l'étang de Campagnol;
- Sur l'étang du Cercle, enfouir les lignes électriques avoisinantes.

### ❖ Interaction avec d'autres espèces

Ces mesures sont aussi favorables aux anatidés hivernants et aux cigognes fréquentant la zone lors de leur migration.