

## Fiche espèce N° 6

## Gravelot à collier interrompu

*Charadrius alexandrinus*

Code Natura 2000 : A 138

## Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe IConvention de Berne : Annexe IIStatut européen : en déclinListe rouge nationale : rareListe rouge LR : en déclin

## Description de l'espèce

Petit limicole au bec court, l'adulte se reconnaît à son front, ses sourcils et son collier blancs; à son bandeau noir très étroit entre le bec et l'œil et la calotte rousse chez le mâle. Le dessus du corps est brun clair uni. Le dessous est blanc avec une tache noire de chaque côté de la poitrine qui s'estompe en automne. Il est très difficile à repérer lorsqu'il est immobile et tapi sur le sol.



## Répartition en Europe

Carte non disponible

## Ecologie

- Habitat : plage de sable ou de galet au dessus de la limite des hautes eaux, dunes basses, bordures des lagunes, marais salants, et sansouires.
- Alimentation : petits invertébrés capturés sur sol nu et humide le plus souvent.
- Reproduction : niche à même le sol dans une cuvette qu'il peut agrémenter de quelques débris de coquillage ou de petit galet. [mai-août]
- Migration : les populations les plus septentrionales migrent dès la fin juin pour les côtes africaine du Nord et de l'Ouest.

## Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

## Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce est largement distribuée sur le littoral français avec des effectifs plus importants sur le pourtour méditerranéen que sur le littoral occidental. Ses effectifs semblent stables en France avec environ 1500 couples recensés. La région LR, et principalement ses étangs, accueillent entre 200 et 300 couples. Ces populations semblent en léger déclin (surtout dans l'Hérault). De petits groupes d'oiseaux sont observés en hivernage.

	Bages - Sigean
Nicheur strict	30 - 100 / 32
Hivernant	32 - 224 / 32

## Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

### ❖ **Etat de conservation**

Les effectifs de Gravelot à collier interrompu sur le site sont très difficiles à évaluer tant l'espèce est discrète. Lors de l'inventaire, 30 couples ont été repérés de façon précise, mais l'effectif réel doit être d'une centaine de couples minimum sur l'ensemble du site. Les effectifs semblent stables.

### ❖ **Caractéristique de l'habitat**

L'espèce exploite toutes les marges lagunaires exondées, les hauts de plages, l'arrière des milieux dunaires et les salins en activité ou non. Les sites de nidification varient dans l'espace selon les niveaux d'eau des lagunes et les coups de mer qui façonnent la plage en hiver. **[Cartes 11.1 à 11.4]**

### ❖ **Menaces**

- Le dérangement des individus sur le site de nidification.
- La destruction involontaire de nombreuses couvées par le piétinements de promeneurs et le passage de véhicules.

### ❖ **Mesures de gestion**

- Canaliser l'accès aux plages par des sentiers balisés particulièrement sur les plages en arrière des salins de Gruissan et de Port-la-Nouvelle;
- Limiter l'accès des véhicules à moteur sur bordures lagunaires et sur les bords de plage;
- Sensibiliser les plaisanciers;

### ❖ **Interaction avec d'autres espèces**

Cette gestion est favorable à la nidification de la Sterne naine et de l'Alouette calandrelle nicheuses sur les mêmes sites.