

Fiche espèce N° 7

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Code Natura 2000 : A 166

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe IConvention de Berne : Annexe IIStatut européen : en déclinListe rouge nationale : non définiListe rouge LR : non défini

Description de l'espèce

Limicole de taille moyenne, le Chevalier sylvain se distingue des autres espèces de chevalier par le net sourcil blanchâtre se prolongeant en arrière de l'œil, par ses pattes jaunâtres, par son plumage grossièrement tacheté sur le dessus, et par sa poitrine finement striée sans limite nette. Il émet en vol un sifflement rapide caractéristique "yif-iff-iff".



Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

L'espèce est uniquement migratrice sur l'ensemble du territoire national et de petits groupes stationnent régulièrement dans les zones humides de préférence douces. Même si les effectifs nicheurs européens sont en régression, on n'observe pas de diminution significative des effectifs migrateurs français. En LR comme sur le territoire national l'ensemble des zones humides accueille l'espèce en migration avec des effectifs qui paraissent stables.

Ecologie

- Habitat : toutes zones humides de préférence douces à saumâtres en migration.
- Alimentation : larves d'insectes, annélides et mollusques prélevés dans la vase.
- Reproduction : niche au sol dans la végétation fournie des tourbières et marais de la taïga.
- Migration : hiverne en Afrique tropicale. Passages de fin juin à fin septembre et de fin mars à début mai.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean
Migrateur	40 - 80 / 50

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ Etat de conservation

Le Chevalier sylvain est observé annuellement aux migrations prénuptiales (avril-mai) et postnuptiales (juin-septembre). Chaque observation concerne des individus isolés, plus régulièrement des groupes d'une dizaine, et exceptionnellement de grands groupes de 30 à 50 individus. Ces effectifs sont fluctuants d'une année sur l'autre sans que l'on puisse envisager une hausse ou une diminution de ceux-ci.

❖ Caractéristique de l'habitat

Ce Chevalier est principalement observé dans les marais doux ou saumâtres (Marais de Saint-Louis, Campagnol, Petit Tournebelle et Petit Castélou) mais aussi dans les rizières inondées (Petit Mandirac, Ancien étang du Cercle). Il recherche des zones faiblement inondées et tranquilles.

❖ Menaces

- La diminution des surfaces inondées;
- La mauvaise qualité des eaux issues du bassin versant ;
- Confusion possible avec des espèces chassables.

❖ Mesures de gestion

- Augmenter les surfaces de marais inondés;
- Diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires et faire lagunier les eaux issues du bassin versant et des stations d'épuration.

❖ Interaction avec d'autres espèces

Cette gestion est favorable à l'ensemble des espèces d'ardéidés, d'anatidés et de limicoles qui exploitent les zones humides du site.