

ZPS BASSE PLAINE DE L'AUDE

Espèces animales remarquables

Goéland railleur

Larus genei

PROTECTION

Espèce protégée en France
Annexe II (Conv. de Berne et Bonn)
Annexe I Directive Oiseaux

LIVRE ROUGE

Rare

DETERMINANTE ZNIEFF

Oui



Photo : X. Rufay

Généralités

DESCRIPTION

Envergure : 90-102 cm

Longueur : 37-42 cm

Goéland un peu plus grand que la mouette rieuse. Le plumage est gris clair dessus, le cou et la poitrine et le ventre sont blancs rosé ce qui est caractéristique de l'espèce. Le bec est rouge foncé, paraissant souvent noir. Les pattes sont assez longues et de couleur rouge.

DISTRIBUTION


Languedoc-Roussillon : niche parfois dans le Gard, l'Hérault et l'Aude

France : Uniquement la Camargue et le Languedoc

ÉCOLOGIE

Le Goéland railleur est caractéristique des milieux lagunaires saumâtres et salés où il se nourrit de poissons et d'invertébrés. En période de reproduction, il niche en colonies compactes, au milieu de ces lagunes sur des digues ou des îlots nus ou avec peu de végétation. Sur la côte méditerranéenne, ce type d'habitat est fourni principalement par les salins.

ZPS Basse Plaine de l'Aude



MIGRATION

L'espèce n'est présente qu'en période de migration dans la ZPS. On l'observe, parfois en grand nombre (>100) sur la lagune de Pissevaches et parfois sur l'étang de Vendres. Le pic de passage se situe fin avril, début mai. À l'automne l'espèce est rare.

Pissevaches constitue une zone de halte migratoire importante pour les oiseaux nichant en Camargue et dans l'Hérault.

L'espèce, moyennant des aménagements d'îlots pourrait très bien nicher sur la lagune de Pissevaches.

Menaces et gestion

FACTEURS DE MENACES

En période migration, les menaces sont difficiles à identifier.

L'assèchement printanier de l'étang de Pissevaches par percement du grau constitue la seule menace

CONSERVATION

Veiller à maintenir un niveau d'eau suffisant au printemps dans l'étang de Pissevaches