

ZPS BASSE PLAINE DE L'AUDE

Espèces animales remarquables

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica



PROTECTION	Espèce protégée en France Annexe II (Conv. de Berne) Annexe I Directive Oiseaux
LIVRE ROUGE	Non
DETERMINANTE ZNIEFF	NON

Généralités

DESCRIPTION

Longueur : 13-14 cm

Petit passereau élancé caractérisé par un net sourcil blanc et une zone rousse à la base de la queue. Chez la femelle, le motif de la gorge se compose en générale d'un arc de tâches noires sur fond blanc grisâtre. Chez le mâle, la gorge est d'un bleu clair brillant bordé par une étroite bande noire, puis une rousse. Au milieu de la partie bleue, une tâche blanche ou rousse peut être observée, mais elle n'est pas présente systématiquement. En plumage d'hiver, les mâles sont semblables aux femelles.

DISTRIBUTION


Languedoc-Roussillon : Présence en migration et en hivernage dans le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

France : Partie centrale de la côte atlantique, nord de la France, Alsace, Jura

ECOLOGIE

Les Gorgebleues à miroir occupent, les zones humides où se développe une végétation buissonneuse basse. Ces milieux doivent être associés à des zones de vase pour l'alimentation, ainsi que des schorres[®], des prairies humides ou des roselières.

ZPS Basse Plaine de l'Aude



MIGRATION ET HIVERNAGE

L'espèce était connue pour se montrer en migration printanière et automnale. Récemment, dans les années 90, des sessions de capture à l'étang de la Matte et à l'étang de Vendres ont démontré que l'espèce hivernait dans les roselières de ces deux étangs. Il en est probablement de même pour la roselière de Pissevaches.

Il est difficile de connaître les effectifs qui sont assez limités (probablement moins de 100 individus à l'échelle de la ZPS)

Menaces et gestion

FACTEURS DE MENACES

Brûlage des roselières en hiver
Fauche des roselières en hiver

CONSERVATION

Maintien des roselières en hiver