

ZPS BASSE VALLEE DE L'AUDE

Espèces animales remarquables

Gravelot à collier interrompu

Charadrius alexandrinus

PROTECTION

Espèce protégée en France
Annexe II (Conv. de Berne et Bonn)
Annexe I Directive Oiseaux

LIVRE ROUGE

Rare

DETERMINANTE ZNIEFF

Oui



X. RUFRAY

Généralités

DESCRIPTION

Echassier de petite taille (16 cm) de couleur sable sur les parties supérieures et blanche sur les parties inférieures. Le bec est court ce qui est caractéristique des gravelots.

DISTRIBUTION

Languedoc-Roussillon : 350 à 450 couples

France : 1 500 couples


ECOLOGIE

L'espèce est principalement migratrice, bien que quelques individus hivernent en Languedoc-Roussillon, en particulier sur les lagunes audoises. L'essentiel des effectifs arrive courant mars et repart en septembre.

L'espèce se reproduit à partir de la fin avril. La femelle pose trois œufs à même le sol, souvent sans même construire de cuvette dans le sable. L'incubation dure 24 à 27 jours et les poussins, nidifuges, sont émancipés au bout de 25 jours.

Le Gravelot à collier interrompu s'alimente préférentiellement de vers polychètes qu'il recherche dans la vase, ou d'insectes (larves et adultes) qu'il chasse sur les plages et arrière-plages.

ZPS Basse Vallée de l'Aude



SITES DE REPRODUCTION

L'espèce se reproduit de manière éparse sur l'ensemble du site de Pissevaches et sur les arrières plages de Fleury et Vendres.

20 à 30 couples sont cantonnés sur la ZPS.

Menaces et gestion

FACTEURS DE MENACES

Dérangement lié à la fréquentation des plages

Prédation par le Goéland leucophée

CONSERVATION

Création d'îlots ou restauration d'îlots existants

Organisation de la fréquentation dans les arrières-plage