

## ZPS DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE

### Espèces animales remarquables

## Lusciniole à moustaches

### *Acrocephalus melanopogon*

#### PROTECTION

Espèce protégée en France  
Annexe II (Conv. de Berne)  
Annexe I Directive Oiseaux

#### LIVRE ROUGE

Rare

#### DETERMINANTE ZNIEFF

OUI



B. Poulin - TDV

### Généralités

#### DESCRIPTION

Longueur : 12-13,5 cm

Passereau brun et chamois au dos diffusément rayé. Le ventre est blanc jaunâtre avec des stries foncées variant selon les individus. Il a un long sourcil clair.

#### DISTRIBUTION

**Languedoc-Roussillon** : Tout le Languedoc-Roussillon

**France** : Pourtour méditerranéen seulement


#### ECOLOGIE

La Lusciniole est une espèce typique des grandes roselières méditerranéennes (phragmitaie, typhaie, scirpaie).

Elle se nourrit souvent près de l'eau sur les tiges couchées de roseaux. Elle niche dès le mois d'avril et l'activité de chant commence donc très tôt dès le mois de mars.

L'espèce est globalement sédentaire, mais des déplacements hivernaux existent en particulier lors de vagues de froid.

### ZPS Basse Vallée de l'Aude



#### SITES DE REPRODUCTION

L'espèce est assez commune dans les roselières de l'étang de la Matte, Vendres et Pissevaches et représente très probablement l'une des plus importantes populations du Languedoc.

La population est estimée entre 100 et 230 couples.

### Menaces et gestion

#### FACTEURS DE MENACES

Les menaces qui pèsent sur la Lusciniole à moustaches sont les disparitions et les pressions qui affectent le milieu :

- L'eutrophisation des étangs
- La gestion hydraulique entraînant un assèchement précoce
- La salinisation des milieux, en particulier des roselières

#### CONSERVATION

Localement, la conservation des roselières constitue la meilleure façon de maintenir les populations de cette espèce.